

LE TUMEFAZIONI MAMMARIE IN ADOLESCENZA

A cura del Dott. Giacomo Antonini

Questo breve paragrafo elenca in maniera sintetica il capitolo delle tumefazioni mammarie rilevabili in adolescenza.

L'incidenza di tumefazioni mammarie in questa fase della vita è mal valutabile; le lesioni riscontrate nella fascia di età compresa tra i 12 e i 20 anni, sono nel 70% fibroadenomi, nel 6% cisti e nel 12% "iperplasie".

TUMEFAZIONI MAMMARIE IN ADOLESCENZA

MASCHI

- Ginecomastia *

FEMMINE

1- DEL PARENCHIMA

- Gemma mammaria in pre-menarca *
- Fibroadenoma *
- Cisti ***
- Mastite periduttale **
- F.adenoma gigante ***
- Papilloma intraduttale ***
- Adenocarcinoma ***

2- DEL COMPLESSO CAPEZZOLO-AREOLA

- Cisti da ritenzione **
- Inversione **
- Mollusco contagioso ***
- Leiomioma ***

Legenda:

riscontro frequente *, intermedio **, raro ***

Dal punto di vista pratico, il rischio di adenocarcinoma in ragazza adolescente è virtualmente inesistente soprattutto quando la lesione ha le caratteristiche di un fibroadenoma; nel maschio adolescente vale lo stesso discorso: si tratta di ginecomastia.

BIBLIOGRAFIA

Stone A.M., Shenker R.I & McCarthy K.: Adolescent breast masses. American Journal of Surgery 1977; 134: 275-277.